

REQUISITI DI IDONEITA' ALLA DONAZIONE DI SANGUE INTERO, DI PLASMA E DI PIASTRINE

SANGUE INTERO

IDONEITA'

Età dai **18 ai 65 anni** (la donazione da parte di soggetti di età superiore a discrezione del medico, così come il reclutamento di un nuovo donatore di età superiore a 60 anni)

Peso **>50 Kg**

Pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra **110 e 180 mm** di mercurio

Pressione arteriosa diastolica deve essere compresa tra **60 e 100 mm** di mercurio

FC ritmica tra **50 e 100** al minuto

Emoglobina: non inferiore a 12,5 g/dL nella donna; non inferiore a 13,5 g/dL nell'uomo

INTERVALLO

Il numero annuo massimo delle donazioni di sangue non deve essere superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in età fertile; l'intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a 90 giorni

PLASMA DA AFERESI

IDONEITA'

Età dai **18 ai 60 anni**

Peso **>50 Kg**

Pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra **110 e 180 mm** di mercurio

Pressione arteriosa diastolica deve essere compresa tra **60 e 100 mm** di mercurio

FC ritmica tra **50 e 100** al minuto

Emoglobina: non inferiore a 11,5 g/dL nella donna; non inferiore a 12,5 g/dL nell'uomo

Protidemia: >6 g/dL nei donatori inseriti in cicli di plasmaferesi continuativa

INTERVALLO

Sangue intero almeno 1 mese dopo una aferesi, 1 mese tra due aferesi, 1 mese tra sangue intero ed aferesi

PIASTRINE DA AFERESI

IDONEITA'

Età dai **18 ai 60 anni**

Peso **>50 Kg**

Pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra **110 e 180 mm** di mercurio

Pressione arteriosa diastolica deve essere compresa tra **60 e 100 mm** di mercurio

FC ritmica tra **50 e 100** al minuto

Emoglobina: non inferiore a 11,5 g/dL nella donna; non inferiore a 12,5 g/dL nell'uomo

Piastrinemia: >200.000 /ul nei donatori di piastrinoaferesi

Protidemia: >6 g/dL nei donatori inseriti in cicli di plasmaferesi continuativa

ESAMI EMATOCHIMICI

(ad ogni donazione dei donatori inseriti in un programma di plasmapiastrinoaferesi continuativa)

HIV-1/2; HCV; HBsAg; VDRL; ALT; Ferritina, Emocromo; Glicemia; Creatinina; Colesterolo; Trigliceridi;

Elettroforesi proteica; HIV RNA; HCV RNA; HBV DNA; Proteine totali; INR, PTT.

INTERVALLO

Sangue intero almeno 1 mese dopo una aferesi, 1 mese tra due aferesi, 1 mese tra sangue intero ed aferesi