

REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 13
(sede legale: via dei Mille 2 – 28100 NOVARA)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

**Oggetto: Vaccinazioni 11 - 12° anno di vita:
anti morbillo - parotite - rosolia e anti varicella**

Ai genitori di
Via
Cap Città

Gentili genitori, siete invitati ad accompagnare il giorno _____ alle ore _____ Vostro figlio,
presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sede di _____ per l'effettuazione
di:

- **seconda dose della vaccinazione antimorbillo, parotite, rosolia
(prima dose se mai vaccinato precedentemente)**
- **vaccinazione antivariella, qualora vostro figlio/a non avesse già superato tale malattia.**

**Vi invitiamo a leggere con attenzione l'allegato n. 1, dove sono elencate alcune
informazioni sulle malattie e sugli effetti collaterali dei vaccini, che peraltro sono rari e, per
l'anti morbillo parotite rosolia, limitati quasi esclusivamente alla prima somministrazione.**

RingraziandoVi per l'attenzione Vi informiamo che gli operatori dei servizi Vaccinali saranno
disponibili per ogni ulteriore chiarimento e precisazione ai seguenti numeri telefonici:

**Se non potete presentarVi all'appuntamento siete pregati di darne tempestiva
comunicazione telefonica ai numeri indicati.**

Si ricorda che tali vaccini sono offerti gratuitamente.

Vi informiamo inoltre che, qualora lo desideriate, a Vostro figlio potrà essere somministrato il
vaccino anti meningococco C. Poiché attualmente in Regione Piemonte non rientra tra i vaccini
prioritari, tale vaccino è disponibile solo a richiesta e previo pagamento di **€ 12,68** da effettuarsi
presso il centro Unico di Prenotazione dell'Ospedale di Borgomanero. Nel caso vogliate vaccinare
Vostro figlio leggete attentamente l'allegato n. 2 dove troverete inoltre il modulo per effettuare il
pagamento.

All'atto della vaccinazione dovrete consegnare copia della ricevuta di avvenuto pagamento.

<p>N.B. – Nel caso non poteste venire personalmente, Vostro figlio/a potrà essere accompagnato da un familiare adulto, delegato per iscritto, a cui dovrà esser consegnato l'allegato 1 debitamente compilato e firmato nella parte retrostante, unitamente ad eventuale documentazione sanitaria relativa a patologie pregresse o in atto</p>

Il **MORBILLO** è una malattia virale molto contagiosa, che si trasmette per via aerea. Si manifesta con febbre alta, tosse insistente, secrezione dal naso, congiuntivite e comparsa di macchie rosse sulla pelle (esantema).

Le complicanze sono più frequenti e gravi nel bambino piccolo e nell'età adulta. Si tratta soprattutto di otiti, laringiti e broncopneumoniti (colpisce il 6% dei malati), convulsioni, encefalite (colpisce in circa 1 caso su 1.000 malati e può essere letale nel 10% dei casi).

La **ROSOLIA** è una malattia infettiva i cui sintomi principali sono la febbre e l'esantema. Le complicanze di tale patologia possono interessare il sistema della coagulazione (porpora trombocitopenica) ed il cervello (encefaliti ad andamento benigno). La rosolia provoca gravi danni se contratta nel primo trimestre di gravidanza in quanto può essere causa nell'85% dei casi di aborto o gravi lesioni al bambino come: sordità, ritardo mentale, cataratta, malformazioni cardiache ecc.(sindrome della rosolia congenita)

La **PAROTITE** (orecchioni) è una malattia che provoca febbre con ingrossamento e dolore a carico delle ghiandole salivari. Le complicanze più comuni sono: pancreatici (4% dei casi), meningiti asettiche (10% dei casi), sordità permanente, encefaliti. Dopo l'adolescenza si possono verificare lesioni a livello dell'apparato genitale maschile (10-38% dei casi) e femminile (4% dei casi) che possono indurre sterilità.

VACCINO ANTI MORBILLO PAROTITE ROSOLIA

E' ben tollerato ed efficace.

Dopo 5 – 12 giorni dalla vaccinazione il bambino può presentare:

Reazioni comuni:

- febbre (5-15% dei casi): dura in media 1 – 3 giorni e in alcuni casi può raggiungere e superare i 39° C,
- comparsa di macchie simili a quelle del morbillo e della rosolia (5% dei casi)
- lieve ingrossamento dei linfonodi e della ghiandola parotide

Reazioni rare

- diminuzione transitori del numero delle piastrine nel sangue (1 caso su 25.000 vaccinati); va comunque precisato che questa problematica si manifesta con maggiore frequenza (1 caso su 3.000 malati) nei bambini che si ammalano di morbillo o rosolia
- dolori articolari (più frequente dopo i 12 anni di età)
- interessamento del sistema nervoso centrale: meno di un caso ogni 200.000 vaccinati (frequenza **300 volte inferiore** a quella provocata dalla malattia morbilloso)

Il vaccino è controindicato soltanto in soggetti che in precedenza abbiano manifestato gravi reazioni anafilattiche alle proteine dell'uovo e alla gelatina.

Nel caso in cui Vostro figlio fosse già stato vaccinato contro queste malattie in precedenza, (nella primissima infanzia o anche successivamente), la seconda dose di vaccino conferirà una più sicura protezione nei confronti di queste malattie. Se invece Vostro figlio/a non avesse ancora ricevuto alcuna dose di vaccino, potrebbe essere l'occasione per cogliere questa opportunità. **Vi informiamo infine che la vaccinazione anti morbillo – parotite – rosolia in un soggetto che abbia superato una di queste malattie, non espone ad alcun effetto collaterale aggiuntivo, ma si limita a rinforzare la protezione immunitaria già esistente.**

La **VARICELLA** è una malattia infettiva contagiosa dell'infanzia, trasmessa per via aerea, che si manifesta con febbre ed un'eruzione cutanea con tipiche vescicole.

Dopo la guarigione il virus rimane nell'organismo e si può riattivare se il sistema immunitario si indebolisce; compare allora l'Herpes zoster – detto comunemente "Fuoco di Sant'Antonio".

Nei soggetti sani le complicazioni legate al virus o alla malattia (nevralgie, cerebellite, polmonite, danni ai tessuti dei reni) sono rare, sono invece più frequenti e accentuate negli adulti, per questo motivo, a partire dall'anno in corso, è prevista l'**offerta gratuita** della vaccinazione anti varicella a tutti gli adolescenti (**nell'anno 2007, i nati nel 1996**) che non abbiano ancora superato la malattia (suscettibili).

VACCINO ANTIVARICELLA

Il **VACCINO** contro la varicella è generalmente ben tollerato; raramente possono comparire gonfiore e rossore nella sede di inoculo. Dopo 5/26 giorni dalla vaccinazione si può avere un rialzo febbrile in genere modesto e di breve durata. Nel 6% dei vaccinati può manifestarsi una lieve eruzione cutanea. In questo caso il virus potrebbe essere trasmesso ai contatti, se non hanno già superato la malattia (particolare attenzione va posta se ci sono donne in gravidanza o soggetti immuno compromessi).

Dovrebbe essere evitato l'utilizzo dell'aspirina nelle sei settimane successive alla vaccinazione

E' prevista un'unica somministrazione che può essere eseguita nella stessa seduta in cui viene eseguita la vaccinazione anti morbillo – parotite -rosolia

Io sottoscritto _____, genitore/tutore

del/la bambino/a _____ essendo stato informato

sull'importanza delle vaccinazioni e sui relativi effetti collaterali,

aderisco alla vaccinazione di mio/a figlio/a contro

morbillo-parotite-rosolia

varicella

antimeningococco C

comunico ha già superato la malattia della varicella

comunico che mio/a figlio/a è già stato vaccinato/a contro

morbillo-parotite-rosolia il _____

varicella il _____

non aderisco alla vaccinazione di mio/a figlio/a contro

morbillo-parotite-rosolia †

varicella

E delego il Sig/la Sig.ra _____ ad accompagnare mio figlio/a perché venga sottoposto/a alle suddette vaccinazioni

Firma del genitore _____

Firma del delegato _____

Data _____

Vaccinazione contro il meningococco C

Il meningococco è un batterio (chiamato scientificamente Neisserie meningitidis) di cui esistono diversi tipi (più di 13), ma solo 2 di essi (tipo B e C) sono presenti in Italia e nel resto dell'Europa Occidentale.

Il meningococco è un batterio che può causare due tipi di malattia invasiva grave: la setticemia (infezione del sangue) e la meningite (infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale).

In alcuni Paesi Europei (Inghilterra, Olanda, Ucraina, Grecia, Spagna, Francia) si sono verificate negli anni scorsi delle epidemie sostenute dal meningococco di tipo C e pertanto in queste Nazioni sono state avviate delle ampie campagne di vaccinazione. In Italia fino ad ora è stato registrato solo un lieve incremento delle infezioni da meningococco C, senza epidemie e con un numero di casi di infezioni (da meningococco C o B) complessivamente contenuto: da 50 a 70 casi annui, nei bambini al di sotto dei 5 anni di età. In questo momento quindi non esistono particolari motivi di allarme per la salute pubblica che inducano a proporre vaccinazioni di massa.

Il rischio di venire aggrediti in modo grave da questo microbo è invece importante nelle persone che presentano malattie che indeboliscono le loro difese:

- difese immunitarie gravemente diminuite a causa di una malattia (per es. infezione da HIV) o di una terapia (chemioterapia antitumorale, radioterapia, uso prolungato di cortisonici ad alte dosi)
- diminuita funzionalità o asportazione chirurgica della milza
- portatori di impianto cocleare

Vaccino antimeningococco C

Il vaccino contro il meningococco C può essere usato dai 2 mesi di età, ha una buona capacità di difendere dalla malattia provocata e conferisce una protezione di lunga durata

Contro il batterio di tipo B non esiste ancora un vaccino.

Effetti collaterali

reazione locale con gonfiore, rossore e dolore, febbre, irritabilità, pianto prolungato (nei bambini piccoli), stanchezza, sonnolenza, diminuzione dell'appetito

Una reazione allergica grave è possibile, ma eccezionale, come per tutti i vaccini.

Chi vaccinare

La vaccinazione è raccomandata per i bambini che soffrono delle malattie descritte sopra, ed in questo caso è offerta gratuitamente.

Potrà essere eseguita anche a Vostro figlio se desiderate ridurre ulteriormente il rischio di malattia meningococcica e potrà essere somministrata presso le sedi vaccinali dell'ASL, previo il pagamento di € 12,68 presso il CUP utilizzando il modulo qui di seguito e presentando la ricevuta di pagamento il giorno della vaccinazione.

MODULO PER PAGAMENTO VACCINO ANTIMENINGOCOCCO C

Cognome e Nome (del bambino) _____

Prestazione: Vaccino Antimeningococco C

costo: Euro 12,68

Il presente importo dovrà essere pagato presso il Centro Unico Prenotazioni

data _____